

una comprende 17 observaciones, de bacilosis tubarí, con peritonitis consecutiva, en las cuales se practicó la laparo-salpingectomía, de cuyos 17 casos hubo 13 curaciones y 4 muertes: de las curadas persistía la curación, en una 14 meses, en otra más de dos años, y en otra más de tres años. De la otra estadística de 24 casos de generalización bacilar peritonítica por salpingitis tuberculosa, se observaron 10 muertos, 3 mejorías, una recidiva, y 10 curaciones: reunidos los casos de estas dos estadísticas resultan 41, con una mortalidad de conjunto de 34 por 100.

En la estadística de Valenta von Marchthurun, comprensiva de 6 casos de salpingitis y perimetrosalpingitis tuberculosas, en todos los casos las lesiones habían provocado tales adherencias que resultó imposible la ablación; se contaron, una muerte á las 24 horas de la intervención; otro caso de mejoría y cuatro de curaciones; una de estas fué vista al cabo de 2 años, sin que presentara indicio alguno de tener tumor pelviano.

Westphal en un trabajo sobre la curabilidad de la peritonitis tuberculosa por la laparotomía publicada en Octubre de 1897, dió á conocer tres casos por él operados, todos los cuales curaron, sin que á los seis meses de la operación presentaran traza de recidiva.

Más para fundamentar un juicio clínico exacto y concluyente, sin que estuviera expuesto á sería contradicción sería preciso poder contar con el promedio de curaciones espontáneas unas, y otras conseguidas con recursos puramente médicos, por ejemplo, revulsivos locales, auxiliados del tratamiento general apropiado; más esto resulta, ya que nó imposible, sumamente difícil: pero resulta incontrovertible que puede curarse espontáneamente la peritonitis tuberculosa, sobre todo en los niños y jóvenes, como lo prueban los casos de Fargas, Casal, Comby, Syderey, Sevestre, Legendre, Millard, Richardiere, Bernhein, Boullaud, y tantos otros.

Así que solamente puede afirmarse que la laparotomía, hoy por hoy, constituye un método de tratamiento superior en un todo, á cuantos se recomiendan contra la peritonitis tuberculosa, pero indudablemente es también cierto que nó á todos los casos se le puede aplicar con idénticas probabilidades de éxito, estando en la actualidad en condiciones de

figérsele las indicaciones y contraindicaciones en los distintos tipos clínicos de peritonitis bacilar.

LA MORTALIDAD EN MURCIA

durante el año 1905

Joaquín Fabregat

Jefe de Estadística

Durante el año próximo pasado, fallecieron en este término municipal, 3187 individuos, de los cuales fueron varones 1702 y hembras 1485; resultando una mortalidad por 1000 habitantes de 27'98, calculados con menos error de media centésima. Relacionando el total de los nacidos con el de los fallecidos, ha habido un exceso de aquellos sobre estos, de 38 habitantes; por lo tanto, el crecimiento natural de la población en el indicado año, ha sido de 0'33 por 1000, cifra que por lo insignificante se presta á consideraciones de importancia, que omitimos por no establecer comparaciones.

Las defunciones clasificadas por las edades de los fallecidos, fué la siguiente:

Menores de 1 año..	693	De 50 á 54 años..	98
De 1 á 4 id. . .	756	De 55 á 59 id. . .	117
De 5 á 9 id. . .	108	De 60 á 64 id. . .	162
De 10 á 14 id. . .	53	De 65 á 69 id. . .	113
De 15 á 19 id. . .	54	De 70 á 74 id. . .	166
De 20 á 24 id. . .	74	De 75 á 79 id. . .	107
De 25 á 29 id. . .	96	De 80 á 84 id. . .	125
De 30 á 34 id. . .	68	De 85 á 89 id. . .	87
De 35 á 39 id. . .	88	De 90 á 94 id. . .	37
De 40 á 44 id. . .	84	De 95 á 99 id. . .	17
De 45 á 49 id. . .	81	De 100 y más años..	3

TOTAL. . . 3187

Del examen de las cifras precedentes, resulta que por 1000 fallecidos dejaron de existir menores de un año, 217'45; de 1 á 14 años, 287'73; de 15 á 29, 70'29; de 30 á 59 años, 168'18, y de 60 en adelante, 256'35. Considerando el período de la niñez de 0 á 12 años, se murieron más de la mitad por 1000 fallecidos; siendo también digna de notarse la proporción de los que murieron de 30 á 59 años, precisamente en el período medio de la vida.

La relación de los nacimientos con respecto á los fallecidos de 0 á 12 años, resulta también una enormidad, pues no llegaron á los 13 años, 488 niños por cada 1000 en los nacidos en el citado año. Hemos tenido ocasión de leer en el tratado de Estadística teórico-práctico de Block, que la duración de la vida del adulto depende mucho más de lo que se cree, de los cuidados prodigados á los niños; así pues, cuando se vea que en alguna parte la vida media es mayor, quiere decir que los niños están mejor cuidados y que su mortalidad ha disminuido.

Réstanos señalar las causas que motivaron las 3187 defunciones, y á su vez la estación del año en